


DENGUE Y CHIKUNGUNYA

Proteha bo mes y otro door di tuma medida manera
drumi bou di muskitero, bisti manga y carson largo y
uza repelente contra sangura



DENGUE | CHIKUNGUNYA


DENGUE Y CHIKUNGUNYA TIN SINTOMANAN PARECIDO Y POR WORDO CONFUNDI CU OTRO. SI BO TA SINTI ALGUN DI E SINTOMANAN AKI, TUMA MESORA CONTACTO CU BO DOKTER DI CAS

	DENGUE	CHIKUNGUNYA
Sangura responsabel pa malesa	<i>Aedes Aegypti</i>	<i>Aedes Aegypti</i> y <i>Aedes Albopictus</i>
Causante di e malesa virus	Dengue Virus tipo 1 Dengue Virus tipo 2 Dengue Virus tipo 3 Dengue Virus tipo 4	Chikungunya virus
Periodo prome cu sintoma presenta	4-7 dia despues di pica di sangura.	3-4 dia despues di pica di sangura.
Sintoma	Keintura 2-7 dia, calafriu, dolor fuerte tras di wowo, dolor di cabes, dolor di bariga, musculo y joints, biramento di cabes, sacamento y diarea rash na curpa. Despues di algun dia sangramento ta hopi comun.	Keintura 2-3 dia, dolor den joints y joints hincha. calafriu, cansancio, mareo (tin biaha acompaña pa sacamento). Dolor di cabes, rash na curpa, Masha tiki tin sangramento.
Intensidad	Por ta fatal.	Casi nunca cu resultado fatal.
Tratamento	Descansa e curpa y bebe hopi likido pa hidratacion. Paracetamol pa dolor y keintura. Sea alerta pa señal di sangramento: Sanger den af, orina, nanishi y/of camí di djente cu ta sangra etc.	Descansa e curpa y bebe hopi likido pa hidratacion. Paracetamol pa dolor y keintura.

SI BO TA PENSA CU BO POR TIN DENGUE OF CHIKUNGUNYA, COMO PRECAUCION, NO TUMA ASPIRINA NI IBUPROFEN Y EVITA

DENGUE Y CHIKUNGUNYA

Proteha bo mes y otro door di tuma medida manera
drumi bou di moskitero, bisti manga y carson largo y
uza repelente contra sangura




DENGUE | CHIKUNGUNYA

DENGUE Y CHIKUNGUNYA TIN SINTOMANAN PARECIDO Y POR WORDO CONFUNDI CU OTRO. SI BO TA SINTI ALGUN DI E SINTOMANAN AKI, TUMA MESORA CONTACTO CU BO DOKTER DI CAS

	DENGUE	CHIKUNGUNYA
Sangura responsabel pa malesa	<i>Aedes Aegypti</i>	<i>Aedes Aegypti</i> y <i>Aedes Albopictus</i>
Causante di e malesa virus	Dengue Virus tipo 1 Dengue Virus tipo 2 Dengue Virus tipo 3 Dengue Virus tipo 4	Chikungunya virus
Periodo prome cu sintoma presenta	4-7 dia despues di pica di sangura.	3-4 dia despues di pica di sangura.
Sintoma	Keintura 2-7 dia, calafriu, dolor fuerte tras di wowo, dolor di cabes, dolor di bariga, musculo y joints, biramento di cabes, sacamento y diarea rash na curpa. Despues di algun dia sangramento ta hopi comun.	Keintura 2-3 dia, dolor den joints y joints hincha. calafriu, cansancio, mareo (tin biaha acompaña pa sacamento). Dolor di cabes, rash na curpa, Masha tiki tin sangramento.
Intensidad	Por ta fatal.	Casi nunca cu resultado fatal.
Tratamento	Descansa e curpa y bebe hopi likido pa hidratacion. Paracetamol pa dolor y keintura. Sea alerta pa señal di sangramento: Sanger den af, orina, nanishi y/of camí di djente cu ta sangra etc.	Descansa e curpa y bebe hopi likido pa hidratacion. Paracetamol pa dolor y keintura.


SI BO TA PENSA CU BO POR TIN DENGUE OF CHIKUNGUNYA, COMO PRECAUCION, NO TUMA ASPIRINA NI IBUPROFEN Y EVITA

Con bo por pega cu Dengue y Chikungunya?



Ora cu e sangura pica un persona cu ta malo cu Dengue of Chikungunya, e sangura ta wordo infecta cu e virus y por transmitie. Ora cu mi ta malo e virus ta presente den mi curpa pa 7 dia. Mi tin cu proteha mi mes for di pica di sangura pa asina mi evita transmision di e virus pa mi famia y amigonan.

Con bo por pega cu Dengue y Chikungunya?



Ora cu e sangura pica un persona cu ta malo cu Dengue of Chikungunya, e sangura ta wordo infecta cu e virus y por transmitie. Ora cu mi ta malo e virus ta presente den mi curpa pa 7 dia. Mi tin cu proteha mi mes for di pica di sangura pa asina mi evita transmision di e virus pa mi famia y amigonan.